

# Осторожно: энтеровирусная инфекция

*Областной Роспотребнадзор напоминает*

**Любой человек может заразиться энтеровирусной инфекцией, которая является возбудителем более миллиарда заболеваний по всему миру.**

Вирус чаще всего передается фекально-оральным путем, а также через загрязненную пищу или воду. Попадание в организм некоторых штаммов вируса воздушно-капельным путем может привести к респираторным заболеваниям. Документально подтверждена и возможность заражения плода через плаценту. Грудное молоко содержит антитела, которые могут защитить новорожденных. Инкубационный период для большинства энтеровирусов составляет от 2-х до 14 дней. В районах с умеренным климатом инфекции возникают в основном летом и осенью.

## **ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЭВИ В ДЕТСКИХ САДАХ И ШКОЛАХ**

- своевременная изоляция детей с признаками острых инфекционных заболеваний;
- проведение утренних филь-

ствия более трёх дней при наличии медсправки;

- недопущение переуплотнения групп, соблюдение нормативов заполняемости групп и классов в детских образовательных организациях;

- надлежащее санитарное состояние и соблюдение режима проветривания помещений в детских образовательных организациях;

- обеспечение условий для соблюдения личной гигиены детьми;

- организация питьевого режима, при использовании бутилированной воды - замена емкости не реже, чем это предусматривается установленным изготовителем сроком хранения вскрытой емкости с водой, обработка дозирующих устройств (по инструкции изготовителя);

- обучение детей первичной профилактике инфекционных заболеваний, контролю за соблюдением личной гигиены;



персоналом пищеблоков правил личной гигиены.

Важен комплекс мер по пресечению распространения инфекции. Необходимо проводить влажную уборку с последующей дезинфекцией помещений, оборудования, инвентаря, посуды и другого (ручки дверей, раковины, вентили кранов и др.).

## **И ДОМА ГИГИЕНУ НУЖНО СОБЛЮДАТЬ!**

Напоминайте дома вашему ребенку о необходимости соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, после возвращения с улицы. Нельзя приобретать продукты у частных лиц и в неустановленных для торговли местах, для питья нужно использовать только кипяченую или бутилированную воду.

Соблюдение профилактических мер позволит предотвратить инфицирование возбудителями энтеровируса.

Помните, своевременное обращение к врачу поможет избежать неблагоприятных последствий для